

perçants pendant la nuit. Ce cri imite le son : *Hahua*, *hahua*, allant crescendo.

*Habitat.* — Zaranou (Indénié).

17. CEPHALOPHUS DORIE Ogilby.

Noms indigènes : *Méné* (trepo) ; *Né* (negan) ; *Buta blabla helké* (plepo).

Une peau sans tête et sans pattes.

*Habitat.* — Achetée au Fort Binger.

18. CEPHALOPHUS RUFILATUS Gray.

Noms indigènes : *Guana* (plepo) ; *Na* (aouro et dialecte de Béréby) ; *Névéra* (negan).

Une peau d'un jeune sans cornes, avec son crâne.

*Habitat.* — Entre Cavally et Sassandra.

19. CEPHALOPHUS MAXWELLI H. Smith.

Nom indigène : *Ketebo* (agni).

Une peau avec des cornes courtes, et son crâne.

*Habitat.* — Grande forêt entre Bianonay et Soubiré.

20. CEPHALOPHUS NIGER Gray.

Noms indigènes : *Belé Blé* (negan) ; *Dibi* (bété).

Une peau avec son crâne (mâle adulte).

Individu de grande taille : le crâne a plus de 20 centimètres de longueur à la base. Les yeux sont d'un noir bleuâtre.

*Habitat.* — Guideko sur le Sassandra. L'espèce s'étend du Libéria à la Côte de l'Or.

---

CATALOGUE DES CRUSTACÉS DE LA FAMILLE DES STÉNOPIDES  
DES COLLECTIONS DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE.

PAR M. E.-L. BOUVIER.

STENOPUSCULUS CRASSIMANUS Richters. — Djibouti (Contière, 1898) 3 ex.  
déterminés par M. Nobili.

STENOPUS SPINOSUS A. Risso. — Nice et Saint-Hospice (*Travailleur*, 1881)  
3 ; Messine (Vialleton, 1900) 1 ; Méditerranée (1883) 1.

— HISPIDUS Olivier. — Mer Rouge (Jousseau, 1897) 1 ; Djibouti  
(Jousseau, 1897) 1 ; Obock (Jousseau, 1897) 1 ; Djibouti  
(Contière, 1898) 1 ; Sainte-Marie-de-Madagascar (Coquerel, 1862) 2 ;  
Madagascar (Grandidier, 1871) 1 ; Mayotte (Coll. A. Milne-Edwards,  
1900) 1 ; Seychelles (Rousseau, ex. déterminés par H. Milne-Edwards)  
3 ; Vanikoro (François, 1894) 1 ; Batavia (Bleeker)

4; Nouvelle-Calédonie (Aubry-Lecomte, 1863) 2; (Germain, 1875) 2; (Heurtel, 1879, 1900) 1; (Coll. A. Milne-Edwards, 1903) 2; Taïti (Culliéret, 1900) 3; (R. Blanchard, 1896) 1; J. Sandwich (Eydox, ex. déterminés par H. Milne-Edwards) 8; (Remy) 1; Pacifique (1874) 2; Cuba (Peters, 1873) 1; Guadeloupe (Lherminier, 1900) 2.

RICHARDINA SPINICINCTA A. Milne-Edwards. — Golfe de Gascogne (*Tra-vaillieur*, 1880) 1 *Type!*

— EDWARDSI Bouvier. — Maroc (*Talisman*, 1883) 2; Cap Bojador (*Talisman*, 1883) 2; Soudan : les Pilones (*Talisman*, 1883) 2 *Types!*

SPONGICOLA VENUSTA de Haan. — Japon (Musée de Leyde, 1880) 1.

— EVOLUTA E.-L. Bouvier. — Soudan : les Pilones (*Talisman*, 1883) 1 *Type!*

— INERMIS E.-L. Bouvier. — Sainte-Lucie (Blake, 1878-1879) 3 *Cotypes!*

---

COLLECTIONS RECUEILLIES PAR M. MAURICE DE ROTHSCHILD  
DANS L'AFRIQUE ORIENTALE.

**Coléoptères : Nouvelles espèces du genre *Lagria*.**

PAR M. F. BORCHMANN (DE HAMBOURG).

1. *Lagria coriacea* nov. sp.

Long., 13 millim. Oblonga, postice leviter ampliata, modice nitida, subtus nitidior, modice convexa, rufo-picea aut elytris toto brunneis, prothorace obscuriore, ore capiteque rufo, breviter griseo-pubescentis, elytris apicem versus dilutioribus; *capite* cum oculis prothorace angustiore, tenuiter rugoso-punctato, subrotundato, antice transversim impresso, inter oculos aequali; oculis nigris, angustis, fortiter emarginatis; *antennis* prothoracis basim paulo superantibus, nigris, sat gracilibus, apicem versus paulo crassioribus, articulo primo rufescente, articulo ultimo praecedenti aequali, apice acuminato; *prothorace* transverso, antice quam postice latiore, elytris valde angustiore, dense rugoso-punctato, lateribus valde arcuatis, angulis anticis obtusis, posticis rectis, lateribus vage basi fortiter marginato; *scutello* minuto, triangulare, fulvo-piloso, elytris concolore; *elytris* ad humeros fere rectis, apice conjunctim rotundatis, transversim rugosis, inter rugas punctatis; *epipleuris* rugose punctatis, dilutioribus. Subtus rufo-brunnea, thorace griseo-villoso; *genuibus*, tibiis tarsisque nigris, *tibiis* paulo arcuatis; *metatarso* pedum posticorum eadem longitudine ac articulis tarsorum sequentium conjunctis; alata.

*Habitat.* — Afrique orientale anglaise. Nairobi (M. de Rothschild),